

インターバル日数： 28 日 基準日： Day 1

最大クール数： 0クール

産婦人科

レジメン名称： PLD/CBDCA+Bev

レジメン説明： プラチナ製剤感受性の再発・卵巣癌/卵管癌/原発性腹膜癌

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)ヘパシマブBS点滴静注「第一三共」 (100mg, 400mg)	10m g /kg		11m g /kg
03	末梢点滴注射	(癌)▲トキシル注20mg (10mL) 用時購入	30m g /m2		33m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」 (50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注ヘック0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:PLD/CBDCA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミタントCap 125mg+80mg (2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 9.9m g		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)ヘパシマブBS点滴静注「第一三共」 (100mg, 400m 生食 (100m l) 療法名:PLD/CBDCA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 2回目60分、3回目以降30分も可 5%TZ配合不可、生食でフラッシュ必要	0m g 100m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲トキシル注20mg (10mL) 用時購入 ブドウ糖 5% (250m l) 療法名:PLD/CBDCA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与前後5%TZフラッシュ必要 投与時ルートにフィルター不可	0m g 250m l		オーダー時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」 (50, 150, 450mg) 生食 (250m l)	0m g 250m l		オーダー時						

最大クール数：0クール

レジメン名称：PLD/CBDCA+Bev

[illegible]

産婦人科

レジメン名称：PLD/CBDCA+Bev

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：PLD/CBDCA+Bev

[illegible]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : PLD/CBDCA+Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	末梢点滴注射	パロリチン点滴静注パッケ0.75mg/50mL「タイホ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:PLD/CBDCA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミタムCap 125mg+80mg(2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 9.9m g								
02	末梢点滴注射	(癌)ベバシマブBS点滴静注「第一三共」(100mg, 400m 生食 (100ml) 療法名:PLD/CBDCA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 2回目60分、3回目以降30分も可 5%TZ配合不可、生食でフラッシュ必要	0m g 100m l		オダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲トキシル注20mg(10mL)用時購入 ブドウ糖 5%(250ml) 療法名:PLD/CBDCA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与前後5%TZフラッシュ必要 投与時ルートにフィルター不可	0m g 250m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:PLD/CBDCA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④ 5%TZでルートキープ可	0m g 250m l								
05	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:PLD/CBDCA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用 <次ページあり>	100m l		オダ時						

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : PLD/CBDCA+Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		アバスチン前後フラッシュ用									
06	末梢点滴注射	ブドウ糖 5 % (250ml) 療法名 : PLD/CBDCA+Bev 末梢点滴注射 : * 点滴時間 2時間で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 ルートキープ用 ドキシル前後フラッシュ用	250ml								

RP	オーダーコメント
01	投与順序①
02	投与順序②
03	投与順序③