

インターバル日数 : 56 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day1~day56)

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	80m g /m2		88m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	1.5 (AUC)		225m g
04	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	400m g /m2		440m g /m2
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	250m g /m2		275m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サリ」 ボラミン注 5mg 生食 【 50 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (500ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56)	0m g 500m l		ホダ時						

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day1～day56)

[illegible]

インターバル日数 : 56 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day1～day56)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サワイ」 ボララミン注 5mg 生食 【 50 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (500ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 250m l		ホダ時						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (100ml)	100m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day1～day56)

[illegible]

インターバル日数 : 56 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day1~day56)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サワイ」 ボララミン注 5mg 生食 【 5 0 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (5 0 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 250m l		ホダ時						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (1 0 0ml)	100m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day1～day56)

[illegible]

インターバル日数 : 56 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day1~day56)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サワイ」 ボララミン注 5mg 生食 【 50 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (500ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1~day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 250m l		ホダ時						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (100ml)	100m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day1～day56)

[illegible]

インターバル日数 : 56 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day1～day56)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サワイ」 ボララミン注 5mg 生食 【 50 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (500ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 250m l		ホダ時						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (100ml)	100m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day1～day56)

[illegible]

インターバル日数 : 56 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day1～day56)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day36	Day37	Day38	Day39	Day40	Day41	Day42
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サワイ」 ボララミン注 5mg 生食 【 5 0 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (5 0 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 250m l		ホダ時						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (1 0 0ml)	100m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day1～day56)

[illegible]

インターバル日数 : 56 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day1～day56)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day43	Day44	Day45	Day46	Day47	Day48	Day49
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サワイ」 ボララミン注 5mg 生食 【 5 0 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (5 0 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 250m l		ホダ時						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (1 0 0ml)	100m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day1～day56)

[illegible]

インターバル日数 : 56 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day1～day56)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day50						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サリ」 ボララミン注 5mg 生食 【 5 0 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (5 0 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (2 5 0ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 250m l		ホダ時						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (1 0 0ml)	100m l								

インターバル日数 : 56 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day1～day56)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day50						
		療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: * 点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑤ アービタックス経過観察用									
07	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day1～day56) 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	250ml		1回/時						