

インターバル日数 : 49 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day57～)

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	20m g /m2		22m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7ロキシ点滴静注ハ`ッヅ (0.75mg/50mL) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② 77°レビ`タントCap 125mg+80mg(3日分)	9.9m g 750μ g		ホ-タ`時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デ`カト`ロ`ン錠8mg/日考慮(下記参照) (day5-7、26-28、47-49)	6.6m g 50m l			ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	0m g 500m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT（day57～）

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day57～)

[illegible]

インターバル日数 : 49 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day57~)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	生食 (1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57~) 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7 ⁰ キシ点滴静注 ^{ハック} (0.75mg/50mL) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57~) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② 7 ⁰ レビ ⁰ タ ⁰ トCap 125mg+80mg(3日分)	9.9m g 750 μ g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day57~) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デ ⁰ カ ⁰ ロ ⁰ ン錠8mg/日考慮(下記参照) (day5-7、26-28、47-49)	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57~) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57~) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (500ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57~)	500m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day57～)

[illegible]

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day57～)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	末梢点滴注射	生食 (1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7 ⁰ キシ点滴静注 ^{ハッ} (0.75mg/50mL) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序② 7 ⁰ レビ ⁰ タトCap 125mg+80mg (3日分)	9.9m g 750 μ g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 デ ⁰ カ ⁰ ロ ⁰ 錠8mg/日考慮(下記参照) (day5-7、26-28、47-49)	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～)	500m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day57～)

[illegible]

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day57～)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	末梢点滴注射	生食 (1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7`キシ点滴静注ハ`ッヅ` (0.75mg/50mL) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② 7`レビ`タトCap 125mg+80mg(3日分)	9.9m g 750 μ g		ホ-タ`時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デ`カ`ロ`ン錠8mg/日考慮(下記参照) (day5-7、26-28、47-49)	6.6m g 50m l			ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～)	500m l		3回	3回	3回	3回			

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day57～)

[illegible]

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day57～)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35
01	末梢点滴注射	生食 (1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7 ⁰ キシ点滴静注 ^{ハッ} (0.75mg/50mL) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序② 7 ⁰ レビ ⁰ タトCap 125mg+80mg (3日分)	9.9m g 750 μ g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 デ ⁰ カ ⁰ ロ ⁰ 錠8mg/日考慮(下記参照) (day5-7、26-28、47-49)	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～)	500m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day57～)

[illegible]

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day57～)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day36	Day37	Day38	Day39	Day40	Day41	Day42
01	末梢点滴注射	生食 (1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7 ⁰ キシ点滴静注 ^{ハッ} (0.75mg/50mL) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序② 7 ⁰ レビ ⁰ タトCap 125mg+80mg (3日分)	9.9m g 750 μ g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 デ ⁰ カ ⁰ ロ ⁰ 錠8mg/日考慮(下記参照) (day5-7、26-28、47-49)	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～)	500m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE+CDDP/RT (day57～)

[illegible]

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day57～)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day43	Day44	Day45	Day46			
01	末梢点滴注射	生食 (1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7`キシ点滴静注ハ`ック` (0.75mg/50mL) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序② 7`レビ`タトCap 125mg+80mg (3日分)	9.9m g 750 μ g		ホ-タ`時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 デ`カ`ロ`ン錠8mg/日考慮(下記参照) (day5-7、26-28、47-49)	6.6m g 50m l			ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	300m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～)	500m l		3回	3回	3回	3回			

インターバル日数 : 49 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : PCE+CDDP/RT (day57～)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day43	Day44	Day45	Day46			
		末梢点滴注射： * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤									
07	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:PCE+CDDP/RT (day57～) 末梢点滴注射： * 点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		〆時	〆時	〆時	〆時			

RP	オーダーコメント
03	投与順序②