

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : cetuximab+CF初回導入

レジメン説明 : 2012移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	400m g /m2		440m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	100m g /m2		110m g /m2
09	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」	1000m g /m2		1100m g /m2
13	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	250m g /m2		275m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	末梢点滴注射	生食(1L) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15時間で 投与経路:末梢静脈メイン1	1000m l		14:00						
02	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l			05:00					
03	末梢点滴注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生食(250ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 45分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	150m g 250m l			09:00					
04	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7mg点滴静注バッグ(0.75mg/50mL) ポララミン注 5mg 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	9.9m g 750μg 5m g			09:45					

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CF初回導入

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : cetuximab+CF初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (500ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 500ml			10:00					
06	末梢点滴注射	生食 (1000ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アービタックス経過観察用 投与順序⑤	100ml			12:00					
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	0mg 500ml			13:00					
08	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6mg 50ml				09:00	09:00	09:00		
09	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」 生食(1L) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦	0mg 1000ml			15:00	15:00	15:00	15:00		
10	末梢点滴注射 <次ページあり>	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射:	300ml			15:00					

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CF初回導入

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : cetuximab+CF初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13
01	末梢点滴注射	生食 (1 L) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: * 点滴時間 15時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1	1000m l								
02	末梢点滴注射	生食 (1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: * 点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
03	末梢点滴注射	プロイメンド点滴静注用15 0 m g 生食 (2 5 0 ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: * 点滴時間 45分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	150m g 250m l								
04	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7πキ点滴静注 ^{ハック} (0.75mg/50mL) ボララミン注 5mg 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	9.9m g 750 μ g 5m g								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	0m g 500m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (1 0 0 ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: * 点滴時間 1時間で	100m l								

歯科口腔外

レジメン名称 : cetuximab+CF初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13
		投与経路:末梢静脈メイン1側管 アービタックス経過観察用 投与順序⑤									
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	0mg 500ml								
08	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6mg 50ml								
09	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」 生食(1L) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦	0mg 1000ml								
10	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦'	300ml								
11	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑧	500ml								
12	末梢点滴注射 ＜次ページあり＞	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg	50ml 5mg			09:00					

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CF初回導入

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : cetuximab+CF初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day14	Day15					
01	末梢点滴注射	生食 (1 L) 療法名 : cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射 : * 点滴時間 15時間で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1	1000m l								
02	末梢点滴注射	生食 (1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名 : cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射 : * 点滴時間 4時間で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
03	末梢点滴注射	プロイメンド点滴静注用15 0 m g 生食 (2 5 0 ml) 療法名 : cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射 : * 点滴時間 45分で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	150m g 250m l								
04	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7πキシ点滴静注ハッグ (0.75mg/50mL) ボララミン注 5mg 療法名 : cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射 : * 点滴時間 15分で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	9.9m g 750 μ g 5m g								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名 : cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射 : * 点滴時間 2時間で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	0m g 500m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (1 0 0 ml) 療法名 : cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射 : * 点滴時間 1時間で	100m l								

歯科口腔外

レジメン名称 : cetuximab+CF初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day14	Day15					
		投与経路:末梢静脈メイン1側管 アービタックス経過観察用 投与順序⑤									
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	0mg 500ml								
08	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6mg 50ml								
09	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トローワ」 生食(1L) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦	0mg 1000ml								
10	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦'	300ml								
11	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑧	500ml								
12	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg	50ml 5mg			09:00					

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : cetuximab+CF初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day14	Day15					
		療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①									
13	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0mg 250ml			09:15					
14	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml								
15	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:cetuximab+CF初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml			ホダ時					