

歯科口腔外

レジメン名称 : 【適外】 CDDP+DTX (動注)

レジメン説明 : 再発・切除不能口腔癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	動脈注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	60m g /m2		66m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)デトキシソール(2 g / 2 0ml) レジメン用	9 g /m2		9.9 g /m2
07	動脈注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	70m g /m2		77m g /m2
08	末梢点滴注射	(癌)デトキシソール(2 g / 2 0ml) レジメン用	12 g /m2		13.2 g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名: 【適外】 CDDP+DTX (動注) 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		ホ-タ-時						
02	末梢点滴注射	ホスアプレミタ点滴静注用150m g 「NK」 生食 (1 0 0ml) 療法名: 【適外】 CDDP+DTX (動注) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	150m g 100m l		ホ-タ-時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V パロセトロン点滴静注パ-ッ-0.75mg/50mL 「タイホ」 療法名: 【適外】 CDDP+DTX (動注) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	9.9m g 750 μ g		ホ-タ-時						
04	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名: 【適外】 CDDP+DTX (動注) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	300m l		ホ-タ-時						

最大クール数：4クール

レジメン名称：【適外】CDDP+DTX（動注）

[illegible]

最大クール数：4クール

レジメン名称：【適外】 CDDP+DTX（動注）

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 4クール

歯科口腔外

レジメン名称 : 【適外】CDDP+DTX (動注)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
11	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名: 【適外】CDDP+DTX (動注) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	6.6mg 50mL			ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			
12	末梢点滴注射	生食 (100mL) 療法名: 【適外】CDDP+DTX (動注) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100mL		ホ-タ`時			ホ-タ`時			

RP	オーダーコメント
05	生食と混合し、58～60mL程度に調製する
07	デトキシソール(9g/mL)と同時に開始