

インターバル日数 : 64 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : CDDP+RT

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	100m g /m2		110m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		ホ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7ロキシ点滴静注ハ`ッグ` (0.75mg/50mL) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 77レビ`タントCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序②	9.9m g 750μ g		ホ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l			ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時			
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		ホ-ダ`時						

インターバル日数 : 64 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : CDDP+RT

05	末梢点滴注射 <次ページあり>	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋)	300m l		ホダ時						
----	--------------------	----------------------------	--------	--	-----	--	--	--	--	--	--

最大クール数：0クール

レジメン名称：CDDP+RT

[illegible]

インターバル日数 : 64 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : CDDP+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	生食 (1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7 ⁰ キシ点滴静注 ^{ハッ} (0.75mg/50mL) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 7 ⁰ レビ ⁰ タ ⁰ Cap 125mg+80mg (2日分) 投与順序②	9.9m g 750 μ g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射:	500m l								

齒科口腔外

レジメン名称：CDDP+RT

[illegible]

インターバル日数 : 64 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : CDDP+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	末梢点滴注射	生食 (1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7 ⁰ キシ点滴静注 ^{ハック} (0.75mg/50mL) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 7 ⁰ レビ ⁰ タトCap 125mg+80mg (2日分) 投与順序②	9.9m g 750 μ g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック(5 0 0ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射:	500m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：CDDP+RT

[illegible]

インターバル日数 : 64 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : CDDP+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	末梢点滴注射	生食 (1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		ホ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 70キシ点滴静注ハ`ツク` (0.75mg/50mL) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 77°レビ`タントCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序②	9.9m g 750μ g		ホ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l			ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時			
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		ホ-ダ`時						
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300m l		ホ-ダ`時						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック(5 0 0ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射:	500m l		3回	3回	3回				

最大クール数：0クール

レジメン名称：CDDP+RT

[illegible]

インターバル日数 : 64 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : CDDP+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35
01	末梢点滴注射	生食 (1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7 ^π キシ点滴静注 ^{ハック} (0.75mg/50mL) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 7 ^π レビ [°] タントCap 125mg+80mg (2日分) 投与順序②	9.9m g 750 μ g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射:	500m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：CDDP+RT

[illegible]

インターバル日数 : 64 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : CDDP+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day36	Day37	Day38	Day39	Day40	Day41	Day42
01	末梢点滴注射	生食 (1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 70キシ点滴静注 ^{ハッ} (0.75mg/50mL) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 70レビ ^タ ントCap 125mg+80mg (2日分) 投与順序②	9.9m g 750 μ g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (500ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射:	500m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：CDDP+RT

[illegible]

インターバル日数 : 64 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : CDDP+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day43	Day44	Day45	Day46			
01	末梢点滴注射	生食 (1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		ホ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 7 ⁰ キシ点滴静注 ^{ハ`ツク`} (0.75mg/50mL) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 7 ⁰ レビ`タントCap 125mg+80mg (2日分) 投与順序②	9.9m g 750 μ g		ホ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l			ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時			
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		ホ-ダ`時						
05	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300m l		ホ-ダ`時						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (5 0 0ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射:	500m l		3回	3回	3回				

インターバル日数 : 64 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

歯科口腔外

レジメン名称 : CDDP+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day43	Day44	Day45	Day46			
		*点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤									
07	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		ホダ時			ホダ時			