

腫瘍センタ【ランゲルハンス組織】レジメン名称 : 【適外】 【臨】 MACOP-B

レジメン説明 : ランゲルハンス組織球症

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビン塩酸塩「NK」(50mg)	50m g /m2		55m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg)	350m g /m2		385m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1mg)	1.4m g /m2		2m g
05	末梢点滴注射	(癌)メトレキート(5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	400m g /m2		440m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲ブレオ(15mg)	10m g /m2		11m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 療法名:【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 プレドニン40mg/m ² /日 連日内服 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分)	1m g		午後時						
02	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビン塩酸塩「NK」(50mg) 生食 (100ml) 療法名:【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		午後時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg) 生食 (250ml) 療法名:【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		午後時						
04	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1mg) 生食 (50mL/袋) 療法名:【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射:	0m g 50m l								

最大クール数：4クール

[illegible]

最大クール数：4クール

[illegible]

最大クール数：4クール

[illegible]

腫瘍センタ【ランゲルハンス組織】レジメン名称：【適外】【臨】MACOP-B

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	末梢点滴注射	グラセプトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 療法名：【適外】【臨】MACOP-B 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 プレドニン40mg/m ² /日 連日内服 アプレピントCap 125mg+80mg(2日分)	1m g		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)★ドキシル`シ`ン塩酸塩「NK」(50mg) 生食 (100ml) 療法名：【適外】【臨】MACOP-B 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 100m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg) 生食 (250ml) 療法名：【適外】【臨】MACOP-B 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 250m l		オ-ダ`時						
04	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1mg) 生食 (50mL/袋) 療法名：【適外】【臨】MACOP-B 末梢点滴注射： ＊点滴時間 5分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 50m l								
05	末梢点滴注射	(癌)マイトレセ-ト(5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 生食 (500ml) 療法名：【適外】【臨】MACOP-B 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l								
06	末梢点滴注射	(癌)▲ブレオ(15mg) 生食 (100ml) 療法名：【適外】【臨】MACOP-B <次ページあり>	0m g 100m l								

最大クール数：4クール

[illegible]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 4クール

腫瘍センタ【ランゲルハンス組織】レジメン名称 : 【適外】 【臨】 MACOP-B

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22						
01	末梢点滴注射	グレースロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 療法名 : 【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射 : *点滴時間 15分で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 プレドニン40mg/m ² /日 連日内服 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分)	1m g								
02	末梢点滴注射	(癌)★ドキシル`シ塩酸塩 「NK」 (50mg) 生食 (100ml) 療法名 : 【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射 : *点滴時間 30分で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 100m l								
03	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン (500mg) 生食 (250ml) 療法名 : 【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射 : *点滴時間 2時間で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 250m l								
04	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン (1mg) 生食 (50mL/袋) 療法名 : 【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射 : *点滴時間 5分で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 50m l		オ`ダ`時						
05	末梢点滴注射	(癌)リトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 生食 (500ml) 療法名 : 【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射 : *点滴時間 2時間で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	(癌)▲ブレオ (15mg) 生食 (100ml) 療法名 : 【適外】 【臨】 MACOP-B	0m g 100m l		オ`ダ`時						

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 4クール

腫瘍センタ【ランゲルハンス組織】レジメン名称 : 【適外】 【臨】 MACOP-B

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22						
		末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③									
07	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:【適外】 【臨】 MACOP-B 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100ml		ホ-タ`時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①
05	ロイコボリン錠15mgをMTX投与24時間後から、6時間毎6回内服する (day9 11:00、17:00、23:00およびday10 05:00、11:00、17:00)