

腫瘍センタ【ランゲルハンス組織】レジメン名称 : 【適外】CHOP-AVP

レジメン説明 : ランゲルハンス組織球症

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)プレドニン水溶性(20mg)(レジメ)	60mg		60mg
02	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1mg)	1.4mg/m2		2mg
03	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビン塩酸塩「NK」(50mg)	45mg/m2		49.5mg/m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg)	650mg/m2		715mg/m2
05	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビン塩酸塩「NK」(50mg)	30mg/m2		33mg/m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」	140mg/m2		154mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	グラセトリ点静注バッグ 1mg/50mL「HK」 (癌)プレドニン水溶性(20mg)(レジメ) 療法名:【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 プレドニン60mg/body day2-5内服 プレドニン60mg/body day9-10内服	1mg 0mg		朝7時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1mg) 生食 (50mL/袋) 療法名:【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0mg 50mL		朝7時						
03	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビン塩酸塩「NK」(50mg) 生食 (100mL) 療法名:【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0mg 100mL		朝7時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg) 生食 (250mL)	0mg 250mL		朝7時						

最大クール数：8クール

[illegible]

最大クール数：8クール

[illegible]

腫瘍センタ【ランゲルハンス組織】レジメン名称：【適外】CHOP-AVP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10				
01	末梢点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 (癌)プレドニン水溶性 (20mg) (レジメ) 療法名：【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 プレドニン60mg/body day2-5内服 プレドニン60mg/body day9-10内服	1mg 0mg		オダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン (1mg) 生食 (50mL/袋) 療法名：【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 5分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0mg 50mL								
03	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビン塩酸塩 「NK」 (50mg) 生食 (100mL) 療法名：【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0mg 100mL								
04	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン (500mg) 生食 (250mL) 療法名：【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 250mL								
05	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビン塩酸塩 「NK」 (50mg) 生食 (100mL) 療法名：【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0mg 100mL		オダ時						
06	末梢点滴注射  <次ページあり>	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サド」 生食 (500mL)	0mg 500mL		オダ時	オダ時	オダ時				

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 8クール

腫瘍センタ【ランゲルハンス組織】レジメン名称 : 【適外】CHOP-AVP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10				
		療法名 : 【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射 : *点滴時間 2時間で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③									
07	末梢点滴注射	生食 ( 1 0 0 ml) 療法名 : 【適外】CHOP-AVP 末梢点滴注射 : *点滴時間 30分で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l		〆-ﾀﾞ`時	〆-ﾀﾞ`時	〆-ﾀﾞ`時				

RP	オーダーコメント
01	投与順序① アﾌﾟﾚﾋﾞ`ﾀﾝﾄCap 125mg+80mg (2日分)