

皮膚科

レジメン名称 : 【適外】DTIC単剤療法

レジメン説明 : 悪性黒色腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)◆ダカルバジン(100mg)	1000mg /m2		1100mg /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	ホスフェノキシド点静注用150mg「NK」 生食 (100ml) 療法名:【適外】DTIC単剤療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	150mg 100ml		ホダ時						
02	末梢点滴注射	パロチロン点静注バック0.75mg/50mL「タイロ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:【適外】DTIC単剤療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	750μg 9.9mg		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆ダカルバジン(100mg) 蒸留水注(100ml) 生食 (250ml) 療法名:【適外】DTIC単剤療法 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 輸液バック、ルートも遮光すること 投与順序③	0mg 200ml 250ml		ホダ時						
04	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:【適外】DTIC単剤療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		ホダ時						

皮膚科

レジメン名称：【適外】DTIC単剤療法

インターバル日数： 21 日 基準日： Day 1 印刷日時： 2024-01-25 18:15:01 最大クール数： 0クール