

基準日： Day 1

最大クール数：0クール

レジメン名称: weekly パクリタキセル+放射線 (血管肉腫)

適用条件：

体表面積計算式： 男性用： $\text{体重}(\text{kg})^{0.425} \times \text{身長}(\text{cm})^{0.725} \times 0.007184$ 女性用： $\text{体重}(\text{kg})^{0.425} \times \text{身長}(\text{cm})^{0.725} \times 0.007184$

AUC計算式： 男性用： $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用： $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタール注「NK」(30mg, 100mg)	60m g /m2		66m g /m2

[illegible]

基準日： Day 1

最大クール数：0クール

【血管肉腫】

レジメン名称：weekly パクリタキセル+放射線（血管肉腫）

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：weekly パクリタキセル+放射線（血管肉腫）

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称: weekly パクリタキセル+放射線 (血管肉腫)

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称: weekly パクリタキセル+放射線 (血管肉腫)

[illegible]

インターバル日数 : 56 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科 【血管肉腫】

レジメン名称 : weekly パクリタキセル+放射線 (血管肉腫)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day36						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サワイ」 ボララミン注 5mg 生食 【 5 0 mL】 療法名:weekly パクリタキセル+放射線 (血管肉腫) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホ-タ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パ`クリタキセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:weekly パクリタキセル+放射線 (血管肉腫) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22μm以下のインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 250m l		ホ-タ`時						
03	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名:weekly パクリタキセル+放射線 (血管肉腫) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホ-タ`時						