

皮膚科

レジメン名称 : 【適外】 CBDCA+PTX

レジメン説明 : 悪性黒色腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	175m g /m2		192.5m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	5(AUC)		750m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイホ」 ファモチジン静注液20mg「サリ」(20mg/20mL) デキサート注 6.6mg/V ポララミン注 5mg 療法名:【適外】CBDCA+PTX 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750μ g 20m g 19.8m g 5m g		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (500ml) 療法名:【適外】CBDCA+PTX 末梢点滴注射: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22μ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 500m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (500ml) 療法名:【適外】CBDCA+PTX 末梢点滴注射: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:【適外】CBDCA+PTX 末梢点滴注射:	100m l		ホダ時						

最大クール数：0クール

レジメン名称：【適外】CBDCA+PTX

[illegible]

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

皮膚科 レジメン名称 : 【適外】 CBDCA+PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用									

RP	オーダーコメント
01	投与順序①