

レジメン説明 : デスモイド腫瘍

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	静脈内注射	(癌)メトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	30m g /m2		33m g /m2
02	静脈内注射	(癌)◆エクザール(10mg)	6m g /m2		6.6m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	静脈内注射	(癌)メトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 生食 (20ml) 療法名: 【適外】MTX-VBL 静脈内注射:	0mg 20ml		朝7時						
02	静脈内注射	(癌)◆エクザール(10mg) 生食 (20ml) 療法名: 【適外】MTX-VBL 静脈内注射:	0mg 20ml		朝7時						