

整形外科

レジメン名称 : 【臨】 大量MTX (Day8-15)

レジメン説明 : 2012移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	中心静脈側管	(癌)メトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	8000m g /m2		8800m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	中心静脈側管	ダイアモックス(500mg) 生食 (100ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管: *点滴時間 1時間で 投与経路: 中心静脈茶側管	250m g 100m l		09:00 21:00	09:00 21:00	09:00 21:00	09:00 21:00			
02	中心静脈側管	ソルデム3A(500ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」(20mg/20mL) メイロン 7% 20mL 療法名: 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管: *点滴速度 80ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	500m l 20m g 20m l		00:00 12:00 18:00						
03	中心静脈側管	ソルデム3A(200ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」(20mg/20mL) メイロン 7% 20mL 療法名: 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管: *点滴速度 70ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	200m l 20m g 20m l		06:00						
04	中心静脈側管	(癌)メトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 生食 (500ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管: *点滴速度 160ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	0m g 500m l		09:00						
05	中心静脈側管	ヴィーン3G (500ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管:	500m l		00:00						

最大クール数：0クール

レジメン名称：【臨】大量MTX (Day8-15)

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：【臨】大量MTX (Day8-15)

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：【臨】大量MTX (Day8-15)

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：【臨】大量MTX (Day8-15)

[illegible]

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 8

最大クール数 : 0クール

整形外科

レジメン名称 : 【臨】 大量MTX (Day8-15)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
07	中心静脈側管	グレースロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 療法名 : 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管 : *点滴時間 15分で 投与経路 : 中心静脈白側管	1m g								
08	中心静脈側管	ヴィーン 3 G (5 0 0 ml) ムクロプラミド 1 0 mg / 2 ml 「NIG」 ソルメドロール静注用 (125mg) メイロン 7 % 2 0 m L 療法名 : 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管 : *点滴時間 6時間で 投与経路 : 中心静脈白側管	500m l 20m g 125m g 20m l								
09	中心静脈側管	ヴィーン 3 G (5 0 0 ml) ムクロプラミド 1 0 mg / 2 ml 「NIG」 療法名 : 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管 : *点滴時間 6時間で 投与経路 : 中心静脈白側管	500m l 20m g								
10	中心静脈側管	ソルデム 3 A (5 0 0 ml) メイロン 7 % 2 0 m L 療法名 : 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管 : *点滴速度 80ml/h 投与経路 : 中心静脈茶側管	500m l 20m l								
11	静脈内注射	レボリナート点滴静注用 「NK」 (25mg) 生食 (2 0 ml) 療法名 : 【臨】 大量MTX (Day8-15) 静脈内注射 : 濃度は約0.75mg/mLにすること	7.5m g 20m l								
12	中心静脈側管	ヴィーン 3 G (5 0 0 ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」 (20mg/20mL) ムクロプラミド 1 0 mg / 2 ml 「NIG」 療法名 : 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管 : *点滴速度 80ml/h 投与経路 : 中心静脈白側管	500m l 20m g 10m g								
13	中心静脈側管 <次ページあり>	ソルデム 3 A (5 0 0 ml)	500m l								

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 8

最大クール数 : 0クール

整形外科

レジメン名称 : 【臨】 大量MTX (Day8-15)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		メイロン 7% 20mL 療法名: 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管: *点滴速度 40ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	20m l								
14	中心静脈側管	ヴィーン3G (500ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」 (20mg/20mL) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管: *点滴速度 40ml/h 投与経路: 中心静脈白側管	500m l 40m g								
15	中心静脈側管	ソルデム3A (500ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管: *点滴速度 40ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	500m l		00:00						
16	中心静脈側管	ヴィーン3G (500ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day8-15) 中心静脈側管: *点滴速度 40ml/h 投与経路: 中心静脈白側管	500m l		00:00						