

腫瘍センタ【悪性褐色細胞腫】 レジメン名称 : CVD

レジメン説明 : 悪性褐色細胞腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1mg)	1.4m g /m2		2m g
03	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg)	750m g /m2		825m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg)	600m g /m2		660m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2					
01	末梢点滴注射	パロチロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイ秒」 療法名:CVD 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレントCap125mg+80mg(2日間) 褐色細胞腫に対しメクロプラミド禁忌	750 μ g		オダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1mg) 生食 (50mL/袋) 療法名:CVD 末梢点滴注射: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 50m l		オダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg) 生食 (250ml) 療法名:CVD 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		オダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg) 蒸留水注(100ml) 生食 (250ml) 療法名:CVD 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で	0m g 100m l 250m l		オダ時	オダ時					

最大クール数：0クール

	＜次ページあり＞	投与経路:末梢静脈メイン1側管								
--	----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

腫瘍センタ【悪性褐色細胞腫】 レジメン名称 : CVD

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2					
		輸液バック、ルートも遮光すること 投与順序④									
05	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:CVD 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時	オーダー時					

RP	オーダーコメント
01	投与順序① ドンペリドン : メトクロプラミドに準じて注意が必要