

腫瘍センタ【ランゲルハンス細胞レジメン名称 : 【適外】 E-CHOP (CHEP)

レジメン説明 : ランゲルハンス細胞腫瘍

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆フィルデシン(1 mg, 3mg)	4m g /m2		4.4m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」	100m g /m2		110m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(5 0 0 mg)	750m g /m2		825m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	末梢点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 療法名: 【適外】 E-CHOP (CHEP) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 デカトロン錠 day1-5内服 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分)	1m g		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆フィルデシン(1 mg, 3mg) 生食 (5 0 mL/袋) 療法名: 【適外】 E-CHOP (CHEP) 末梢点滴注射: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 50m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」 生食 (5 0 0 ml) 療法名: 【適外】 E-CHOP (CHEP) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l		オ-ダ`時	オ-ダ`時	オ-ダ`時				
04	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(5 0 0 mg) 生食 (2 5 0 ml) 療法名: 【適外】 E-CHOP (CHEP) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管	0m g 250m l		オ-ダ`時						

腫瘍センタ【ランゲルハンス細胞レジメン名称: 【適外】 E-CHOP (CHEP)

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 8クール

腫瘍センタ【ランゲルハンス細胞レジメン名称 : 【適外】 E-CHOP (CHEP)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
05	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:【適外】 E-CHOP (CHEP) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		〇-タ`時	〇-タ`時	〇-タ`時				

RP	オーダーコメント
01	投与順序①