

インターバル日数： 28 日 基準日： Day 1 最大クール数： 0クール

腫瘍センタ【副腎癌】 レジメン名称： EDP

レジメン説明： 副腎癌

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 ： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	末梢点滴注射	(癌)★ドキソルビシン塩酸塩「NK」(50mg)	40m g /m2		44m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サント」	100m g /m2		110m g /m2
09	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	40m g /m2		44m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイバ」 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 day1-28ミタ1日3回内服 適宜増減 d1-アプレミタントCap125mg+80mg3日分	3.3m g 750 μ g		ホダ時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	3.3m g 50m l			ホダ時					
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l						ホダ時	ホダ時	
04	末梢点滴注射	生食 (1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で	1000m l 8m l				ホダ時	ホダ時			

最大クール数：0クール

レジメン名称：EDP

	＜次ページあり＞	投与経路:末梢静脈メイン1側管								
--	----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

腫瘍センタ【副腎癌】

レジメン名称 : EDP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
		投与順序①									
05	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	9.9mg 50mL				ホーダ時	ホーダ時			
06	末梢点滴注射	(癌)★トキシルビン塩酸塩「NK」(50mg) 生食 (100mL) 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0mg 100mL		ホーダ時						
07	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サント」 生食 (500mL) 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0mg 500mL			ホーダ時	ホーダ時	ホーダ時			
08	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300mL				ホーダ時	ホーダ時			
09	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500mL) 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0mg 500mL				ホーダ時	ホーダ時			
10	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (500mL) 療法名:EDP 末梢点滴注射:	500mL				3回	3回	3回	3回	

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

腫瘍センタ【副腎癌】

レジメン名称 : EDP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
		*点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑥									
11	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:EDP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100ml		〇-タ`時	〇-タ`時	〇-タ`時	〇-タ`時			

RP	オーダーコメント
01	<ul style="list-style-type: none"> ・ミタソ (ホ`プリム) は化学療法開始1-2週間前から内服を開始すること。患者に応じて漸増可、最終的に血中濃度が14-20mg/Lとなるよう用量調節を行うこと。 ・ミタソ血清値は最初の3ヶ月は2-3週毎に、プラトーに達したら6週毎に測定可。 ・投与順序① ・DXR総投与量を考慮して、最大12コースまで。