

腫瘍センタ【平滑筋肉腫】 レジメン名称 : 【適外】 DXR+トラベクテジン

レジメン説明 : 平滑筋肉腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技     | 薬剤名称                     | 標準値(1回量)   | 標準値 | 上限値         |
|----|--------|--------------------------|------------|-----|-------------|
| 02 | 中心静脈側管 | (癌)★ドキシルビン塩酸塩「NK」(50mg)  | 60m g /m2  |     | 66m g /m2   |
| 03 | 中心静脈側管 | (癌)◆ヨンデリス静注用(0.25mg、1mg) | 1.1m g /m2 |     | 1.21m g /m2 |

| RP | 手技      | 薬剤名称  | 用量/単位                         | 処方1回量 | Day1               | Day2 |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|---|-------------------------------|-------|--------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 中心静脈側管  | パロセトロン点滴静注 <sup>ハッ</sup> 0.75mg/50mL「タイホ」<br>デキサート注 6.6mg/V<br>療法名:【適外】DXR+トラベクテジン<br>中心静脈側管:<br>*点滴時間 15分で<br>投与経路:中心静脈シングル側管<br>デカドロン錠8mgを3日間(制吐剤)<br>投与順序① | 750 <sup>μ</sup> g<br>13.2m g |       | オ-ダ <sup>7</sup> 時 |      |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 中心静脈側管  | (癌)★ドキシルビン塩酸塩「NK」(50mg)<br>生食 (100ml)<br>療法名:【適外】DXR+トラベクテジン<br>中心静脈側管:<br>*点滴時間 15分で<br>投与経路:中心静脈シングル側管<br>投与順序②   | 0m g<br>100m l                |       | オ-ダ <sup>7</sup> 時 |      |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 中心静脈側管  | (癌)◆ヨンデリス静注用(0.25mg、1mg)<br>生食 (500ml)<br>療法名:【適外】DXR+トラベクテジン<br>中心静脈側管:<br>*点滴時間 3時間で<br>投与経路:中心静脈シングル側管<br>投与順序③  | 0m g<br>500m l                |       | オ-ダ <sup>7</sup> 時 |      |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 中心静脈メイン | 生食 (100ml)<br>療法名:【適外】DXR+トラベクテジン<br>中心静脈注射(メイン):<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:中心静脈シングル<br>ルートキープ用   | 100m l                        |       | オ-ダ <sup>7</sup> 時 |      |  |  |  |  |  |  |

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 6クール

腫瘍センタ【平滑筋肉腫】

レジメン名称 : 【適外】 DXR+トラベクテジン

|    |                  |                   |         |  |  |       |  |  |  |  |  |
|----|------------------|-------------------|---------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 05 | 皮下注射<br><次ページあり> | ジーラスタ皮下注 3. 6 m g | 3. 6m g |  |  | オ-ダ`時 |  |  |  |  |  |
|----|------------------|-------------------|---------|--|--|-------|--|--|--|--|--|

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

腫瘍センタ【平滑筋肉腫】

レジメン名称 : 【適外】DXR+トラベクテジン

| RP | 手技 | 薬剤名称                          | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | Day2 |  |  |  |  |  |
|----|----|-------------------------------|-------|-------|------|------|--|--|--|--|--|
|    |    | 療法名: 【適外】DXR+トラベクテジン<br>皮下注射: |       |       |      |      |  |  |  |  |  |

| RP | オーダーコメント  |
|----|---|
| 02 | 毒性に応じて、DXR : 60mg/m <sup>2</sup> →50mg/m <sup>2</sup> →45mg/m <sup>2</sup> 、トラベクテジン : 1.1mg/m <sup>2</sup> →0.9mg/m <sup>2</sup> →0.7mg/m <sup>2</sup> の減量は許容される。 |
| 03 | 6サイクルまでDXR+トラベクテジンを併用し、その後トラベクテジン維持療法を行う(最大12ヶ月、17サイクルまで)。  |