

# 医薬品安全使用ニュース

## ラモトリギン錠の適正使用について

当院採用薬：ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」、ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」  
ラモトリギン錠25mg「トーワ」、ラモトリギン錠100mg「トーワ」  
※院外は一般名処方（先発品の商品名：ラミクタール）

効能効果・用法用量は

添付文書 または

DIニュース2024年6月1号

「ラモトリギン錠の処方にあたって」を参照



### 概要

ラモトリギンは、維持用量の投与までに漸増が必要であり、併用薬に応じて用法用量が設定されるため、使用時には必ず投与スケジュールをご確認ください

### 注意すべきポイント

ラモトリギンにより、重篤な皮膚障害が発現するおそれがあります

用法用量の逸脱により皮膚障害の発現率が高くなり、2015年2月に重篤な皮膚障害に関して**安全性速報(ブルーレター)**が発出され、「**用法用量の遵守**」、「**皮膚障害の早期発見・早期治療に努めること**」の2点、注意喚起がなされております。

#### 参考資料

- ・ラモトリギン錠「トーワ」添付文書
- ・ラミクタール錠小児用2mg、同錠小児用5mg、同錠25mg、同錠100mgによる重篤な皮膚障害について(安全性速報) <https://www.pmda.go.jp/files/000198343.pdf>
- ・ラモトリギン錠「トーワ」適正使用に関するお願い(2023.11 東和薬品株式会社)
- ・DIニュース2024年6月1号「ラモトリギン錠の処方にあたって」