

泌尿器科

レジメン名称 : GCarbo

レジメン説明 : 尿路上皮癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注バッグ ^{0.75mg/50mL} 「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレビントCap 125mg+80mg(2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 9.9m g		10:00						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100mL) 療法名:GCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		10:15						
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) ブドウ糖 5%(500mL) 療法名:GCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	0m g 500m l		10:45						

泌尿器科

レジメン名称：GCarbo

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：GCarbo

[illegible]

泌尿器科		レジメン名称 : GCarbo									
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	パロチロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 「タイパ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 アプレミントCap 125mg+80mg (2日分) デカトロン錠8mgを3日間 (制吐剤)	750 μ g 9.9m g								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	6.6m g 50m l		10:00						
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムタリン点滴静注液 (200mg, 1g) 「ヤルト」 ブドウ糖 5% (100mL) 療法名:GCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 100m l		10:15						
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン 「NK」 (50, 150, 450mg) ブドウ糖 5% (500mL) 療法名:GCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	生食 (100mL) 療法名:GCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l		10:00						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①