

泌尿器科

レジメン名称 : GDC

レジメン説明 : 2012移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	60m g /m2		66m g /m2
05	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	70m g /m2		77m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:GDC 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l			06:00					
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GDC 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l		10:00		10:00	10:00	10:00		
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイバ」 療法名:GDC 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 day2〜アプロピカン125mg+80mg(2日) 投与順序②	9.9m g 750μ g			10:00					
04	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (250mL) 療法名:GDC 末梢点滴注射:	0m g 250m l		10:15						

レジメン名称： GDC

[illegible]

泌尿器科		レジメン名称： GDC									
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:GDC 末梢点滴注射: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 ｽｽﾌﾟﾗﾝ投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (5 0 mL/袋) 療法名:GDC 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	6.6m g 50m l		10:00						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ﾊﾟﾛｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL 「ﾀｲﾎﾞ」 療法名:GDC 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 day2～ﾌﾟﾚﾎﾞﾀﾝﾄ125mg+80mg (2日) 投与順序②	9.9m g 750 μ g								
04	末梢点滴注射	(癌)◆ﾄﾞﾍﾞｷｾﾙ注「ﾆﾌﾟﾙ」 (20mg, 80mg) 生食 (2 5 0 ml) 療法名:GDC 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 250m l								
05	末梢点滴注射	(癌)ｹﾞﾑｼﾀﾃﾞﾝ点滴静注液(200mg, 1g) 「ﾔﾙﾄ」 ブドウ糖 5 % (1 0 0 ml) 療法名:GDC 末梢点滴注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 100m l		10:15						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	マンニトールS注射液 (300mL/袋)	300m l								

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

泌尿器科

レジメン名称 : GDC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		療法名:GDC 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③									
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:GDC 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	0m g 500m l								
08	末梢点滴注射	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:GDC 末梢点滴注射: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑤	500m l								
09	末梢点滴注射	生食 (1 0 0 ml) 療法名:GDC 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l		10:00						
10	静脈内注射	パリンNa ⁺ 用 10 単位/mL 10ml 療法名:GDC 静脈内注射:	10m l								