

泌尿器科

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1
レジメン名称 : (免)オプジーボ[®] (240mg/body)+カボ[®]メイクス (2W毎) 最大クール数 : 0クール

レジメン説明 : 切除不能腎細胞癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌) オプジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg)	240m g		240m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌) オプジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)オプジーボ [®] (240mg/body)+カボ [®] メイクス (2W毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 カボ [®] メイクス (1日1回・40mg/回) 処方 0.2～0.22μmのインラインフィルターで投与	0mg 100ml		オーダー時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)オプジーボ [®] (240mg/body)+カボ [®] メイクス (2W毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	カボ [®] メイクス減量 40mg/日→20mg/日→20mg/日 (隔日) →中止