

泌尿器科

レジメン名称 : GEMOX

レジメン説明 : 精巣腫瘍

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタベン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)◆オキサリプラチン点滴静注液 (50mg, 100mg)「NK」	130m g /m2		143m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	グラセトリオン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GEMOX 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分) デカドロン錠4mgを2日間(制吐剤)	1m g 3.3m g		朝7時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GEMOX 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタベン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100mL) 療法名:GEMOX 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		朝7時						
04	末梢点滴注射	(癌)◆オキサリプラチン点滴静注液 (50mg, 100mg)「NK」 デキサート注 1.65mg/A ブドウ糖 5%(500mL) 療法名:GEMOX 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で	0m g 2A 500m l		朝7時						



最大クール数：0クール

レジメン名称：GEMOX

[illegible]

泌尿器科		レジメン名称 : GEMOX									
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GEMOX 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分) デカドロン錠4mgを2日間(制吐剤)	1m g 3.3m g								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GEMOX 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	6.6m g 50m l		午後時						
03	末梢点滴注射	(癌)ゲラニトロン点滴静注液(200mg, 1g) 「ヤルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:GEMOX 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 100m l		午後時						
04	末梢点滴注射	(癌)◆オキサリプラチン点滴静注液 (50mg, 100mg) 「NK」 デキサート注 1.65mg/A ブドウ糖 5%(500ml) 療法名:GEMOX 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 2A 500m l								
05	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:GEMOX 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l		午後時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①