

最大クール数：0クール

レジメン名称：(免)キイトルーダ+パドセブ

AUC計算式 : 男性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

[illegible]

泌尿器科

レジメン名称 : (免)キイトルーダ+パドセブ

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	(癌)▲パドセブ点滴静注用 (20mg, 30mg) 蒸留水注 (1 0 0 ml) 生食 (1 0 0 ml) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 最終濃度は0.3～4mg/mL 最大125mg/body	0m g 100m l 100m l		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (1 0 0 ml) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 0.2～5μ mのインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 100m l								
03	末梢点滴注射	生食 (1 0 0 ml) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l		オ-ダ`時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①
02	KEYNOTE-A39試験/EV-302試験では、キイトルーダは最大35サイクル、パドセブは投与サイクル上限なし。