

泌尿器科

レジメン名称 : GDCarbo

レジメン説明 : 2012移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	60m g /m2		66m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2
05	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GDCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l		10:00						
02	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注バッグ®0.75mg/50mL「タイコ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GDCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 day2〜7パレチント125mg+80mg(2日) day3-7パレトロン8mg3日間浮腫・制吐	750 μ g 9.9m g			10:00					
03	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (250mL) 療法名:GDCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		10:15						
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100mL) 療法名:GDCarbo 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で	0m g 100m l		11:15						

最大クール数：0クール

レジメン名称： GDCarbo

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：GDCarbo

[illegible]

泌尿器科		レジメン名称： GDCarbo									
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 （5 0 mL/袋） 療法名：GDCarbo 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	6.6m g 50m l		10:00						
02	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL「タイ妙」 デキサート注 6.6mg/V 療法名：GDCarbo 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 day2～ﾌﾟﾚﾐｴﾝﾄ125mg+80mg(2日) day3-ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg3日間浮腫・制吐	750 μ g 9.9m g								
03	末梢点滴注射	(癌)◆ﾄﾚﾀｾﾙ注「ﾆﾌﾟﾛ」(20mg, 80mg) 生食 （2 5 0 ml） 療法名：GDCarbo 末梢点滴注射： ＊点滴時間 1時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 250m l								
04	末梢点滴注射	(癌)ｾﾐﾀﾚﾝ点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5％(1 0 0 ml) 療法名：GDCarbo 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 100m l		10:15						
05	末梢点滴注射	(癌)▲ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾃﾝ「NK」(50, 150, 450mg) ブドウ糖 5％(5 0 0 ml) 療法名：GDCarbo 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 500m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 （1 0 0 ml） 療法名：GDCarbo	100m l		10:00						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

泌尿器科 レジメン名称 : GDCarbo

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用									
07	静脈内注射	ヘパリンNaパック用 10 単位/mL 10ml 療法名 :GDCarbo 静脈内注射:	10m l								

RP	オーダーコメント
02	投与順序①