

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

泌尿器科 レジメン名称 : (免)ニボルマブ(術後補助1年間) (4週間)

レジメン説明 : 尿路上皮癌 (術後補助療法)

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)オプジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg)	480m g		480m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)オプジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)ニボルマブ(術後補助1年間) (4週間) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2～0.22μmのインラインフィルターで投与 最大投与期間1年	0mg 100ml		朝7時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)ニボルマブ(術後補助1年間) (4週間) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		朝7時						