

泌尿器科

レジメン名称 : トーリセル

レジメン説明 : 2012移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌) トーリセル点静注25mg	25m g		25m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 (5 0mL/袋) ポララミン注 5mg 療法名: トーリセル 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路: 末梢静脈メイン1 側管 投与順序①	50m l 5m g		10:00						
02	末梢点滴注射	(癌) トーリセル点静注25mg 生食 (2 5 0ml) 療法名: トーリセル 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢静脈メイン1 側管 フィルターが必要です。 投与順序②	0m g 250m l		10:15						
03	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名: トーリセル 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		10:00						