

泌尿器科

レジメン名称：CDDP単独療法（1日投与）

レジメン説明：前立腺癌

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	35m g /m2		38.5m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	末梢点滴注射	大塚生食注（1 L） 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:CDDP単独療法（1日投与） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		ホ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	パロセトン点滴静注ﾊﾞｯｸ`0.75mg/50mL「タイク」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:CDDP単独療法（1日投与） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 ｱﾌﾟﾚﾎﾞﾀﾝﾄCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序②	750μ g 9.9m g		ホ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食（5 0 mL/袋） 療法名:CDDP単独療法（1日投与） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l			ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時			
04	末梢点滴注射	マンニトールS注射液（300mL/袋） 療法名:CDDP単独療法（1日投与） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	300m l		ホ-ダ`時						
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	0m g		ホ-ダ`時						

泌尿器科

レジメン名称 : CDDP単独療法 (1日投与)

	<次ページあり>	生食 (500ml)	500ml								
--	----------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

泌尿器科

レジメン名称：CDDP単独療法（1日投与）

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		療法名:CDDP単独療法（1日投与） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④									
06	末梢点滴注射	ラクテック（500ml） 療法名:CDDP単独療法（1日投与） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 6時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	500m l		2回	2回	2回				
07	末梢点滴注射	生食（100ml） 療法名:CDDP単独療法（1日投与） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホーダ`時			ホーダ`時			
08	静脈内注射	へ`リンNaソック用 10 単位/mL 10ml 療法名:CDDP単独療法（1日投与） 静脈内注射：	10m l			ホーダ`時	ホーダ`時				