

当院採用の消炎鎮痛剤（外用）一覧 ver2.0

		成分名	商品名 院内外採用 院外採用	サイズ 包装	用法用量	使用期限	アスピリン喘息 に対する禁忌	妊婦 に対する禁忌	注意事項
テープ 剤	局 所 作 用 型	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープS20mg「ティコク」	7×10cm 7枚/袋	1日1回	2年	禁忌	一部禁忌 (妊娠後期)	・光線過敏症を起こす事があるので、使用中および使用後当分の間は紫外線曝露に注意が必要
			ケトプロフェンテープ40mg「パテル」	10×14cm 7枚/袋	1日1回	3年	禁忌	一部禁忌 (妊娠後期)	
		ロキソプロフェン ナトリウム	ロキソニンテープ50mg	7×10cm 7枚/袋	1日1回	3年	禁忌	なし	
			ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	10×14cm 7枚/袋	1日1回	2年	禁忌	なし	
	全身 作用 型	エスフルビプロフェン・ ハッカ油	ロコアテープ	10×14cm 7枚/袋	1日1回 ★1日貼付枚数 2枚まで	2年	禁忌	一部禁忌 (妊娠後期)	・2枚貼付時の全身曝露量が、経口剤の通常用量と同程度であることから、内服のNSAIDs同様に禁忌 が多数設定されている ・適応は変形性関節症における鎮痛・消炎のみ ・他の全身作用を期待する消炎鎮痛剤との併用は可能な限り避ける
		ジクロフェナク ナトリウム	ジクトルテープ75mg	7×10cm 1枚/袋	1日1回 ★1日貼付枚数 がん：3枚まで がん以外：2枚まで	2年	禁忌	禁忌	・3枚貼付時の全身曝露量が、経口剤の通常用量と同程度であることから、内服のNSAIDs同様に禁忌 が多数設定されている ・適応は、①がんにおける鎮痛（1日2～3枚）、②腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群および腱鞘 炎における消炎・鎮痛（1日1～2枚） ・他の全身作用を期待する消炎鎮痛剤との併用は可能な限り避ける
パ ッ プ 剤	ケトプロフェン	モーラスパップ60mg	20×14cm 7枚/袋	1日2回	3年	禁忌	一部禁忌 (妊娠後期)	・光線過敏症を起こす事があるので、使用中および使用後当分の間は紫外線曝露に注意が必要	
		モーラスパップXR120mg	10×14cm 7枚/袋	1日1回	2年	禁忌	一部禁忌 (妊娠後期)		
		モーラスパップXR240mg	20×14cm 7枚/袋	1日1回	2年	禁忌	一部禁忌 (妊娠後期)		
	ロキソプロフェン ナトリウム	ロキソプロフェンNaパップ100mg「杏林」	10×14cm 7枚/袋	1日1回	2年6ヶ月	禁忌	なし		
	フルビプロフェン	ゼボラスパップ40mg	10×14cm 7枚/袋	1日2回	3年	禁忌	なし		
	フェルピナク	セルタッチパップ70	10×14cm 7枚/袋	1日2回	3年	禁忌	なし		
	サリチル酸メチル,dl-カンフル,ト メントール	MS冷シップ「タカミツ」	10×14cm 5枚/袋	1日1～2回	3年	なし	なし		
	サリチル酸メチル,dl-カンフル,ト ウガラシエキス	MS温シップ「タイホウ」	10×14cm 5枚/袋	1日1～2回	3年	なし	なし	・入浴前の30分以上前にはがし、入浴後は直ちに使用しない	
そ の 他	ケトプロフェン	セクターローション3%	50mL/本	1日数回	3年	禁忌	一部禁忌 (妊娠後期)	・光線過敏症を起こす事があるので、使用中および使用後当分の間は紫外線曝露に注意が必要 ・ODT※では使用しない	
	ロキソプロフェン ナトリウム	ロキソニゲル1%	25g/本	1日数回	3年	禁忌	なし	・ODT※では使用しない	
	ジクロフェナク ナトリウム	ボルタレゲル1%	25g/本	1日数回	3年	禁忌	なし	・ODT※では使用しない	
	フェルピナク	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	40g/本	1日数回	3年	禁忌	なし	・ODT※では使用しない	
		ナバゲルンクリーム3%	25g/本	1日数回	3年	禁忌	なし	・ODT※では使用しない	
	インドメタシン	インテバンクリーム1%	25g/本	1日数回	3年	禁忌	なし	・ODT※では使用しない	
		インテバン外用液1%	50mL/本	1日数回	3年	禁忌	なし	・ODT※では使用しない	
	サリチル酸メチル,dl-カンフル,ト メントール,グリチルレチン酸	スチックゼノールA	40g/本	1日数回	3年	なし	なし		