

眼科

レジメン説明 : 眼内悪性リンパ腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	その他の手技	(癌)メトトレキサート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	50m g		50m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	その他の手技	(癌)メトトレキサート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 蒸留水注(20ml) 療法名:【適外】メトトレキサート硝子体注射 その他の手技(具体的に記載): 硝子体内に注射 メトトレキサート400μg/0.05mL/1回	0mg 6.25ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	メトトレキサート50mgを蒸留水6.25mLで溶解し8mg/mLとし、0.05mL(400μg)を使用する。 多めにシリンジに採取しているため(0.2mL)、必要量の0.05mLを投与すること。