

肝臓胆嚢膵【アロカリスなし】 レジメン名称 : (免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法

レジメン説明 : 胆道癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg)	1500m g		1500m g
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	25m g /m2		27. 5m g /m2
05	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液 (200mg, 1g) 「ヤルト」	1000m g /m2		1100m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg) 生食 (250ml) 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2〜0.22μmのインラインフィルターで投与 体重≤30kgの1回投与量は20mg/kg	0m g 250m l		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	大塚生食注(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) KCL注20mEqキット 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序②	1L 8m l 20m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイホ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デキサート錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序③	750μ g 6.6m g		オ-ダ`時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml)	0m g 500m l		オ-ダ`時						

肝臓胆嚢膵【アロカリスなし】 レジメン名称：(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法

[illegible]

最大クール数：0クール

[illegible]

最大クール数：0クール

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg) 生食 (250ml) 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2~0.22μmのインラインフィルターで投与 体重≤30kgの1回投与量は20mg/kg	0mg 250ml								
02	末梢点滴注射	大塚生食注(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) KCL注20mEqキット 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序②	1L 8ml 20ml		オーダー時						
03	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注パッケ0.75mg/50mL「タイホ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカトロン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序③	750μg 6.6mg		オーダー時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 500ml		オーダー時						
05	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	0mg 100ml		オーダー時						
<次ページあり>											

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【アロカリスなし】 レジメン名称 : (免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		投与順序⑤									
06	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml								
07	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)デュルバルマブ+GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序① 臨床試験 (TOPAZ-1試験) ではデュルバルマブ+GC (3週毎) を最大8サイクル投与後、デュルバルマブ維持 (1500mg、4週間毎) を投与した。