

肝臓胆嚢膵

レジメン名称：（免）デュルバルマブ＋トレメリムマブ

レジメン説明：肝細胞癌

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)イジユド点滴静注 (300mg/15mL)	300m g		300m g
02	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg)	1500m g		1500m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)イジユド点滴静注 (300mg/15mL) 生食 (250ml) 療法名: (免)デュルバルマブ＋トレメリムマブ 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2～0.22μmのインラインフィルターで投与 体重≤30kgの1回投与量は4mg/kg	0m g 250m l		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg) 生食 (250ml) 療法名: (免)デュルバルマブ＋トレメリムマブ 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2～0.22μmのインラインフィルターで投与 体重≤30kgの1回投与量は20mg/kg	0m g 250m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名: (免)デュルバルマブ＋トレメリムマブ 末梢点滴注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序① HIMALAYA試験では、トレメリムマブは初回（1回）のみ投与、その後はデュルバルマブのみ投与を繰り返した。
02	投与順序②