

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵

レジメン名称 : ラムシルマブ単剤投与

レジメン説明 : がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細胞癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)サイラムザ点滴静注液 (100mg, 500mg)	8m g /kg		8.8m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 ボララミン注 5mg 療法名:ラムシルマブ単剤投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)サイラムザ点滴静注液 (100mg, 500mg) 生食 (2 5 0 ml) 療法名:ラムシルマブ単剤投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2～0.22 μ mのインラインフィルターで投与 2回目以降30分で投与可	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	生食 (1 0 0 ml) 療法名:ラムシルマブ単剤投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホダ時						

RP	オーダーコメント
02	投与順序②