

肝臓胆嚢膵【アロカリスなし】 レジメン名称 : (免)ペムブロリズマブ+GEM維持療法

レジメン説明 : 胆道癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	200m g		200m g
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタレン点滴静注液 (200mg, 1g) 「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)ペムブロリズマブ+GEM維持療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2〜5μmのインラインフィルターで投与 投与順序①	0m g 100m l		オダ時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:(免)ペムブロリズマブ+GEM維持療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	6.6m g 50m l		オダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタレン点滴静注液 (200mg, 1g) 「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:(免)ペムブロリズマブ+GEM維持療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 100m l		オダ時						
04	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)ペムブロリズマブ+GEM維持療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オダ時						

最大クール数：0クール

[illegible]

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名: (免)ペムブロリズマブ+GEM維持療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2～5μmのインラインフィルターで投与 投与順序①	0mg 100ml								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名: (免)ペムブロリズマブ+GEM維持療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	6.6mg 50ml		オーダー時						
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液 (200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名: (免)ペムブロリズマブ+GEM維持療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0mg 100ml		オーダー時						
04	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名: (免)ペムブロリズマブ+GEM維持療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	臨床試験 (KEYNOTE-966試験) ではペムブロリズマブ+GEM+CDDPを最大8サイクル投与後、ペムブロリズマブ+GEMへ移行し、PDまで継続した。ペムブロリズマブは最大35サイクル実施した。(CDDPの投与回数制限は8サイクル、GEMの投与回数制限はなかった。)