

インターバル日数 : 0 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【肝移植】

レジメン名称 : 【ソル・メドロール】 リツキサン (肝移植)

レジメン説明 : ABO血液型不適合・抗ドナー抗体強陽性肝移植

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌) リツキサン(100mg, 500mg)	375m g /m2		412.5m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 (50mL/袋) ボララミン注 5mg 療法名: 【ソル・メドロール】 リツキサン (肝移植) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アセトアミノフェンの内服が必要です 投与順序①	50m l 5m g		ホダ時						
02	静脈内注射	ソルメドロール静注用 (40mg) 生食注シリンジ「オーツカ」 20mL 療法名: 【ソル・メドロール】 リツキサン (肝移植) 静脈内注射: 投与順序②	20m g 20m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌) リツキサン(100mg, 500mg) 生食 (500ml) 療法名: 【ソル・メドロール】 リツキサン (肝移植) 末梢点滴注射: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	生食 (1000ml) 療法名: 【ソル・メドロール】 リツキサン (肝移植) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホダ時						