

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 70クール

脳神経外科

レジメン名称 : 【適外】 weekly Vinblastine

レジメン説明 : 低悪性度神経膠腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	静脈内注射	(癌)◆エクザール(10mg)	6mg/m ²		10mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	静脈内注射	(癌)◆エクザール(10mg) 生食 (20ml) 療法名:【適外】 weekly Vinblastine 静脈内注射:	0mg 10ml		午後時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:【適外】 weekly Vinblastine 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用 投与後フラッシュ用 (全開投与)	100ml		午後時						