

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

脳神経外科

レジメン名称 : 2wベバシズマブB S (再発・初発療法)

レジメン説明 : 悪性神経膠腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)ベバシズマブBS点滴静注「第一三共」 (100mg, 400mg)	10m g /kg		11m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)ベバシズマブBS点滴静注「第一三共」 (100mg, 400mg) 生食 (100ml) 療法名:2wベバシズマブB S (再発・初発療法) 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 2回目60分、3回目以降30分も可	10m g 100ml		0-24時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:2wベバシズマブB S (再発・初発療法) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		0-24時						