

整形外科

レジメン名称 : GD療法

レジメン説明 : 非小円形細胞肉腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシレン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクト」	900m g /m2		990m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	70m g /m2		77m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GD療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 day9-10フェカミン錠8mg(浮腫予防) 投与順序①	6.6m g 50m l		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシレン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:GD療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (250ml) 療法名:GD療法 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l								
04	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:GD療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						

最大クール数：6クール

レジメン名称：GD療法

[illegible]

整形外科		レジメン名称 : GD療法									
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GD療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 day9-107カト`ロ錠8mg(浮腫予防) 投与順序①	6.6m g 50m l		ホ-タ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタ`ン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100mL) 療法名:GD療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		ホ-タ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆ト`セタキセル注「ニフ`ロ」(20mg, 80mg) 生食 (250mL) 療法名:GD療法 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホ-タ`時						
04	末梢点滴注射	生食 (100mL) 療法名:GD療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホ-タ`時						