

整形外科

レジメン名称 : Dox単剤療法

レジメン説明 : 非小円形細胞肉腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビン塩酸塩「NK」(50mg)	75m g /m2		82.5m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	パロセトン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名:Dox単剤療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序① オランザピン5mg (day1-4)	750 μ g 9.9m g 235m g		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビン塩酸塩「NK」(50mg) 生食 (100ml) 療法名:Dox単剤療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② デキサメタゾン錠8mg(day2-4)	0m g 100m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:Dox単剤療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホダ時						