

整形外科

レジメン名称 : 【臨】 大量MTX (Day0-7)

レジメン説明 : 2012移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	中心静脈側管	(癌)ミノレキト (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	8000m g /m2		8800m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	中心静脈メイン	ビーフリード 500ml 療法名:【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈注射 (メイン): *点滴速度 30ml/h 投与経路:中心静脈茶	500m l		12:00						
02	中心静脈メイン	ビーフリード 500ml 療法名:【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈注射 (メイン): *点滴速度 30ml/h 投与経路:中心静脈白	500m l		12:00						
03	中心静脈側管	ダイアモックス(500mg) 生食 (100ml) 療法名:【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈茶側管	250m g 100m l		09:00 21:00	09:00 21:00	09:00 21:00	09:00 21:00	09:00 21:00		
04	中心静脈側管	ソルデム3A(500ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」(20mg/20mL) メイロン 7% 20mL 療法名:【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 80ml/h 投与経路:中心静脈茶側管	500m l 20m g 20m l			00:00 12:00 18:00					
05	中心静脈側管	ソルデム3A(200ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」(20mg/20mL) メイロン 7% 20mL 療法名:【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 70ml/h	200m l 20m g 20m l			06:00					

レジメン名称：【臨】大量MTX (Day0-7)

[illegible]

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

整形外科

レジメン名称 : 【臨】 大量MTX (Day0-7)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
06	中心静脈側管	(癌)メトレキサート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 生食 (500ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 160ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	0mg 500ml			09:00					
07	中心静脈側管	ヴィーン3G (500ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 80ml/h 投与経路: 中心静脈白側管	500ml			00:00					
08	中心静脈側管	ソルデム3A (500ml) ソルメドロール静注用 (125mg) メイロン 7% 20mL 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 80ml/h 投与経路: 中心静脈白側管	500ml 125mg 20ml			06:00					
09	中心静脈側管	グラセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴時間 15分で 投与経路: 中心静脈白側管	1mg			08:00	08:00	08:00	08:00		
10	中心静脈側管	ヴィーン3G (500ml) メトプロラト 10mg/2ml 「NIG」 ソルメドロール静注用 (125mg) メイロン 7% 20mL 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴時間 6時間で 投与経路: 中心静脈白側管	500ml 20mg 125mg 20ml			12:00					
11	中心静脈側管	ヴィーン3G (500ml) メトプロラト 10mg/2ml 「NIG」 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴時間 6時間で 投与経路: 中心静脈白側管	500ml 20mg			18:00					
12	中心静脈側管 <次ページあり>	ソルデム3A (500ml)	500ml				00:00	00:00	00:00		

レジメン名称：【臨】大量MTX (Day0-7)

[illegible]

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

整形外科

レジメン名称 : 【臨】 大量MTX (Day0-7)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7						
01	中心静脈メイン	ビーフリード 500ml 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈注射 (メイン): *点滴速度 30ml/h 投与経路: 中心静脈茶	500ml								
02	中心静脈メイン	ビーフリード 500ml 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈注射 (メイン): *点滴速度 30ml/h 投与経路: 中心静脈白	500ml								
03	中心静脈側管	ダイアモックス (500mg) 生食 (100ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴時間 1時間で 投与経路: 中心静脈茶側管	250mg 100ml								
04	中心静脈側管	ソルデム3A (500ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」 (20mg/20mL) メイロン 7% 20mL 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 80ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	500ml 20mg 20ml								
05	中心静脈側管	ソルデム3A (200ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」 (20mg/20mL) メイロン 7% 20mL 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 70ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	200ml 20mg 20ml								
06	中心静脈側管	(癌)マトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 生食 (500ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 160ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	0mg 500ml								
07	中心静脈側管 <次ページあり>	ヴィーン3G (500ml) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7)	500ml								

レジメン名称：【臨】大量MTX (Day0-7)

[illegible]

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

整形外科

レジメン名称 : 【臨】 大量MTX (Day0-7)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7						
		静脈内注射: 濃度は約0.75mg/mLにすること									
14	中心静脈側管	ヴィーン3G (500ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」 (20mg/20mL) メトプロプラミド 10mg/2ml 「NIG」 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 80ml/h 投与経路: 中心静脈白側管	500ml 20mg 10mg								
15	中心静脈側管	ソルデム3A (500ml) メイロン 7% 20mL 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 40ml/h 投与経路: 中心静脈茶側管	500ml 20ml		00:00 12:00						
16	中心静脈側管	ヴィーン3G (500ml) ファモチジン静注液20mg「サリ」 (20mg/20mL) 療法名: 【臨】 大量MTX (Day0-7) 中心静脈側管: *点滴速度 40ml/h 投与経路: 中心静脈白側管	500ml 40mg		00:00 12:00						