

腫瘍センタ【【後発】リツキシマブ】レジメン名称 : R-CEOP（内服）（【後】リツキシマブ）

レジメン説明 : 非ホジキンリンパ腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg)	750m g /m2		825m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」	50m g /m2		55m g /m2
05	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1mg)	1.4m g /m2		2m g
06	末梢点滴注射	(癌)リツキシマブBS点滴静注「KHK」(100mg, 500mg)	375m g /m2		412.5m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 (50mL/袋) ポララミン注 5mg 療法名:R-CEOP（内服）（【後】リツキシマブ） 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アセトアミノフェンの内服が必要です	50m l 5m g		朝7時						
02	末梢点滴注射	グラセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 療法名:R-CEOP（内服）（【後】リツキシマブ） 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 プレドニゾロン100mg/日, day1-5内服	1m g		朝7時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg) 生食 (250ml) 療法名:R-CEOP（内服）（【後】リツキシマブ） 末梢点滴注射: ＊点滴時間 90分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	0m g 250m l		朝7時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」 生食 (250ml) 療法名:R-CEOP（内服）（【後】リツキシマブ） 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 day2-3:エトポシド(100mg/m ²)内服	0m g 250m l		朝7時						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

腫瘍センタ【【後発】リツキシマレジメン名称 : R-CEOP（内服）（【後】リツキシマブ）

05	末梢点滴注射 <次ページあり>	(癌)◆オンコビン(1 mg)	0m g		オーダー時						
----	--------------------	------------------	------	--	-------	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

腫瘍センタ【【後発】リツキシマブレジメン名称 : R-CEOP (内服) (【後】リツキシマブ)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		生食 (50mL/袋) 療法名:R-CEOP (内服) (【後】リツキシマブ) 末梢点滴注射: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	50m l								
06	末梢点滴注射	(癌)リツキシマブBS点滴静注「KHK」(100mg, 500mg) 生食 (500ml) 療法名:R-CEOP (内服) (【後】リツキシマブ) 末梢点滴注射: *点滴速度 200ml/h 投与経路:末梢静脈メイン1側管	0mg 500m l		オーダー時						
07	末梢点滴注射	生食 (1000ml) 療法名:R-CEOP (内服) (【後】リツキシマブ) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						