

腫瘍センタ【多発性骨髄腫】 レジメン名称：MPB（1サイクル目）

レジメン説明：MM

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用： $\text{体重}(\text{kg})^{0.425} \times \text{身長}(\text{cm})^{0.725} \times 0.007184$ 女性用： $\text{体重}(\text{kg})^{0.425} \times \text{身長}(\text{cm})^{0.725} \times 0.007184$

AUC計算式 : 男性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|------|-------------------------|-----------|-----|------------|
| 01 | 皮下注射 | (癌)ボルテゾミブ注射用 3mg 「DSEP」 | 1.3mg /m2 | | 1.43mg /m2 |

[illegible]

最大クール数：1クール

レジメン名称：MPB（1サイクル目）

[illegible]

最大クール数：1クール

レジメン名称：MPB（1サイクル目）

[illegible]

最大クール数：1クール

レジメン名称：MPB（1サイクル目）

[illegible]

インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 1クール

腫瘍センタ【多発性骨髄腫】 レジメン名称 : MPB (1サイクル目)

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | | | |
|----|------|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 01 | 皮下注射 | (癌)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生食 (20ml) 療法名:MPB (1サイクル目) 皮下注射: メルファラン 9mg/m ² 経口day1-4 プレトニゾロン 60mg/m ² 経口day1-4 | 0mg 1.2ml | | ホーダ`時 | | | ホーダ`時 | | | |