

腫瘍センタ【原発不明癌】

レジメン名称：【適外】CP(カルボ`プラチン+パ`クリタセル) (原発不明)

インターバル日数： 21 日

基準日： Day 1

最大クール数： 8クール

レジメン説明：原発不明がん

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆パ`クリタセル注「NK」 (30mg, 100mg)	200m g /m2		220m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボ`プラチン「NK」 (50, 150, 450mg)	6(AUC)		900m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	パ`ロ`セトロン点滴静注パ`ック`0.75mg/50mL「タイオ」 ファモチジン静注液20mg「サリ」 (20mg/20mL) デキサート注 6.6mg/V ポララミン注 5mg アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名：【適外】CP(カルボ`プラチン+パ`クリタセル) (原発不明 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デ`カト`ロン錠8mgを3日間(制吐剤) 投与順序①	750 μ g 20m g 19.8m g 5m g 235m g		オ`ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パ`クリタセル注「NK」 (30mg, 100mg) 生食 (500ml) 療法名：【適外】CP(カルボ`プラチン+パ`クリタセル) (原発不明 末梢点滴注射： ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22 μ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 500m l		オ`ダ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボ`プラチン「NK」 (50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名：【適外】CP(カルボ`プラチン+パ`クリタセル) (原発不明 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		オ`ダ`時						
04	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名：【適外】CP(カルボ`プラチン+パ`クリタセル) (原発不明	100m l		オ`ダ`時						

最大クール数：8クール

レジメン名称：【適外】CP(カルボフマチン+パクリタキセル)(原発不明)

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 8クール

腫瘍センタ【原発不明癌】 レジメン名称 : 【適外】 CP (カルボプラチン+パクリタセル) (原発不明)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用									

RP	オーダーコメント
01	根拠論文ではday5-12にG-CSF投与が推奨されている