

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : dose dense TC

レジメン説明 : 卵巣癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)【 ケ 用】ファモチジン注20mg「 ホ ハ ラ 」	20m g		20m g
02	末梢点滴注射	(癌)【 ケ 用】ファモチジン注20mg「 ホ ハ ラ 」	20m g		20m g
03	末梢点滴注射	(癌)◆ パ クリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	80m g /m2		88m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲ カル ボ プ ラチン「NK」(50, 150, 450mg)	6 (AUC)		900m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	ア ロ キシ点滴静注バ ッ グ ッ (0.75mg/50mL) (癌)【 ケ 用】ファモチジン注20mg「 ホ ハ ラ 」 デキサート注 6.6mg/V ボララミン注 5mg 療法名:dose dense TC 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 ア プ レ ビ タ ント Cap 125mg+80mg(2日分) デ カ ト ロン 錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 0m g 9.9m g 5m g		ホ ダ 時						
02	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 (癌)【 ケ 用】ファモチジン注20mg「 ホ ハ ラ 」 デキサート注 6.6mg/V ボララミン注 5mg 療法名:dose dense TC 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 0m g 6.6m g 5m g								
03	末梢点滴注射	(癌)◆ パ クリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:dose dense TC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22 μ m以下のインラインフィルターで投与	0m g 250m l		10:00						

産婦人科

レジメン名称 : dose dense TC

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称 : dose dense TC

[illegible]

レジメン名称 : dose dense TC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	アロキシ点滴静注バグ [®] (0.75mg/50mL) (癌)【 [℥] 用】ファモチジン注20mg「ホハラ」 デキサート注 6.6mg/V ボララミン注 5mg 療法名:dose dense TC 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレピ [®] タントCap 125mg+80mg(2日分) デ [®] カ [®] ロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 0m g 9.9m g 5m g								
02	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 (癌)【 [℥] 用】ファモチジン注20mg「ホハラ」 デキサート注 6.6mg/V ボララミン注 5mg 療法名:dose dense TC 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 0m g 6.6m g 5m g		ホ [®] ダ [®] 時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆ [®] パ [®] クリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:dose dense TC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22 μ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 250m l		10:00						
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボ [®] プラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:dose dense TC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l								
05	末梢点滴注射	生食 (2 5 0ml) 療法名:dose dense TC 末梢点滴注射: *点滴速度 30ml/h <次ページあり>	250m l		ホ [®] ダ [®] 時						

最大クール数：0クール

レジメン名称 : dose dense TC

[illegible]

レジメン名称 : dose dense TC

<次ページあり>

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : dose dense TC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用									

RP	オーダーコメント
01	投与順序①