

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : AP

レジメン説明 : 子宮体癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	末梢点滴注射	(癌)★ドキシルビシ塩酸塩「NK」(50mg)	60m g /m2		66m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	50m g /m2		55m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:AP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l		1回						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V アロキシ点滴静注バッグ <sup>®</sup> (0.75mg/50mL) 療法名:AP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミクタ <sup>®</sup> Cap 125mg+80mg(2日分) 投与順序②	9.9m g 750 μ g		ホ-ダ <sup>®</sup> 時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:AP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l			ホ-ダ <sup>®</sup> 時	ホ-ダ <sup>®</sup> 時	ホ-ダ <sup>®</sup> 時			
04	末梢点滴注射	マンニトールS注射液(300mL/袋) 療法名:AP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	300m l		ホ-ダ <sup>®</sup> 時						

レジメン名称：AP

[illegible]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : AP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
05	末梢点滴注射	(癌)★ドキシル <sup>®</sup> シ塩酸塩「NK」(50mg) 生食 (100ml) 療法名:AP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 100ml		12:00						
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:AP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0mg 500ml		12:30						
07	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:AP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	500ml		2回	3回	3回				
08	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:AP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦	500ml		3回						
09	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:AP 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml		17時						