

産婦人科

レジメン名称 : (免) Pembro (400mg) 維持

レジメン説明 : 子宮内膜癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	400m g		400m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名: (免) Pembro (400mg) 維持 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2～5μmのインラインフィルターで投与	0mg 100ml		ホダ時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名: (免) Pembro (400mg) 維持 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		ホダ時						

RP	オーダーコメント
01	NRG-GY018試験では、化学療法+ペムブロリズマブ (6サイクル) とペムブロリズマブ維持 (400mg/回) (14サイクル) を合わせて最大20サイクル実施