

産婦人科

レジメン名称 : 【臨】 MEA

レジメン説明 : 絨毛性疾患

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	静脈内注射	(癌)ミノトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	150m g		150m g
03	末梢点滴注射	(癌)ミノトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	300m g		300m g
04	静脈内注射	(癌)◆コスメゲン(0.5mg) 要予約	0.5m g		0.5m g
05	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」	100m g		100m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	末梢点滴注射	グラネキロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:【臨】 MEA 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 Day6-7にデキサトロン錠8mg(制吐剤) 投与順序①	1m g 6.6m g		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時		
02	静脈内注射	(癌)ミノトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 生食 ( 2 0 ml) 療法名:【臨】 MEA 静脈内注射: 投与順序②	0m g 20m l		12:00						
03	末梢点滴注射	(癌)ミノトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 生食 (5 0 0 ml) 療法名:【臨】 MEA 末梢点滴注射: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0m g 500m l		12:00						
04	静脈内注射	(癌)◆コスメゲン(0.5mg) 要予約 蒸留水注( 2 0 ml) 療法名:【臨】 MEA 静脈内注射: 投与順序④	0m g 5m l		18:00	18:00	18:00	18:00	18:00		
05	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」	0m g		18:00	18:00	18:00	18:00	18:00		

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : 【臨】 MEA

	<次ページあり>	生食 (500ml)	500ml								
--	----------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科 レジメン名称 : 【臨】 MEA

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		療法名: 【臨】 MEA 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑤									
06	末梢点滴注射	生食 (500ml) 療法名: 【臨】 MEA 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	500ml		〆-ﾀﾞ`時	〆-ﾀﾞ`時	〆-ﾀﾞ`時	〆-ﾀﾞ`時	〆-ﾀﾞ`時		

RP	オーダーコメント
03	ロイコボリン錠15mgをMTX開始24時間後より、3回内服する (day2 12:00、day3 00:00、day3 12:00)
04	フィルター不可 (フィルターに吸着するとの報告がある)