

産婦人科

レジメン名称 : テブダック

レジメン説明 : 子宮頸癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184    女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25)    女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)テブダック点滴静注40mg	2m g /kg		2.2m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)テブダック点滴静注40mg 蒸留水注(100ml) 生食 (100ml) 療法名:テブダック 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2μmのインラインフィルターで投与 投与開始前に眼科受診必須!	0mg 100ml 100ml		オーダー時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:テブダック 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	<div>・最大200mg/body。最終濃度は0.7～2.4mg/mLとなるよう希釈</div> <div>・投与5分前～投与終了30分後までアイスパックで眼球冷却を行う</div> <div>・治療中はコンタクトレンズ使用禁止</div> <div>・副腎皮質ステロイド点眼を投与24時間前から4日間投与</div> <div>・血管収縮点眼剤（グリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%：当院採用はアイファガン）を投与直前に1回投与（1-3滴）</div> <div>・ドライアイ治療用点眼剤を投与開始～投与終了後30日目まで毎日複数回投与</div>