

産婦人科

レジメン名称 : 【臨】 EMA/EP療法

レジメン説明 : 絨毛癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」	150m g /m2		165m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	75m g /m2		82. 5m g /m2
09	末梢点滴注射	(癌)◆コスメゲン(0. 5mg) 要予約	0. 5m g		0. 5m g
10	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」	100m g /m2		110m g /m2
11	末梢点滴注射	(癌)メトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	300m g /m2		330m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名: 【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	パ`ロノセトロン点滴静注パ`ック`0. 75mg/50mL 「タイホ」 デキサート注 6. 6mg/V 療法名: 【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 ア`レビ`タントCap 125mg+80mg (2日分) 投与順序②	750 μ g 9. 9m g		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6. 6mg/V 生食 (5 0 mL/袋) 療法名: 【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6. 6m g 50m l			オ-ダ`時	オ-ダ`時	オ-ダ`時			
04	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」 生食 (5 0 0 ml) 療法名: 【臨】 EMA/EP療法	0m g 500m l		オ-ダ`時						

最大クール数：0クール

レジメン名称：【臨】EMA/EP療法

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：【臨】EMA/EP療法

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：【臨】EMA/EP療法

[illegible]

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : 【臨】 EMA/EP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名: 【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注パック®0.75mg/50mL 「タイパ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名: 【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレピタムCap 125mg+80mg (2日分) 投与順序②	750 μ g 9.9m g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名: 【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サント」 生食 (500ml) 療法名: 【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l								
05	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名: 【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名: 【臨】 EMA/EP療法	0m g 500m l								

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : 【臨】 EMA/EP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		末梢点滴注射: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑤									
07	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑥	500ml								
08	末梢点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分) デカロン錠4mg/日を2日間(制吐剤)	1mg 3.3mg		オダ時						
09	末梢点滴注射	(癌)◆コスメゲン(0.5mg) 要予約 蒸留水注(20ml) 生食 (50mL/袋) 療法名:【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0mg 1.1ml 50ml		オダ時						
10	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」 生食 (500ml) 療法名:【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	0mg 500ml		オダ時						
11	末梢点滴注射 <次ページあり>	(癌)メトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 生食 (500ml) 療法名:【臨】 EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 12時間で	0mg 500ml		オダ時						

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : 【臨】EMA/EP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④									
12	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:【臨】EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml		オーダー時						
13	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:【臨】EMA/EP療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml								

RP	オーダーコメント
08	投与順序①
09	フィルター不可 (フィルターに吸着するとの報告がある)
11	MTX開始24時間後より、ロイコボリン錠15mg/回 (1日2回) 2日間 (day9、10) 内服する。