

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

産婦人科

レジメン名称 : (免) テ`ュルハ`ルマフ`+TC

レジメン説明 : 子宮内膜癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg)	1120m g		1120m g
03	末梢点滴注射	(癌)◆パ`クリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	175m g /m2		192.5m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボ`プラチン「NK」(50, 150, 450mg)	6 (AUC)		900m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:(免) テ`ュルハ`ルマフ`+TC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2~0.22μmのインラインフィルターで投与 投与順序①	0m g 250m l		ホ`ダ`時						
02	末梢点滴注射	パ`ロノセ`ロン点滴静注バ`ック`0.75mg/50mL「タイホ」 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mg/20mL) デキサート注 6.6mg/V ポララミン注 5mg アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名:(免) テ`ュルハ`ルマフ`+TC 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 テ`カト`ロン錠8mgを3日間(制吐剤) 投与順序②	750μ g 20m g 19.8m g 5m g 235m g		ホ`ダ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆パ`クリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (5 0 0ml) 療法名:(免) テ`ュルハ`ルマフ`+TC 末梢点滴注射: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22μm以下のインラインフィルターで投与 投与順序③	0m g 500m l		ホ`ダ`時						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 6クール

産婦人科

レジメン名称 : (免) テ`ュルハ`ルマブ`+TC

04	末梢点滴注射 <次ページあり>	(癌)▲カルボ`プラチン「NK」(50, 150, 450mg)	0m g		ホ`ダ`時						
----	--------------------	----------------------------------	------	--	-------	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 6クール

産婦人科

レジメン名称 : (免) デュルハルマブ+TC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		生食 (250ml) 療法名: (免) デュルハルマブ+TC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	250ml								
05	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名: (免) デュルハルマブ+TC 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml		10分						