

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【放射線併用【なし】レジメン名称 : GC (GEM+CDDP) 療法

レジメン説明 : 胆道癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	25m g /m2		27.5m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) KCL注20mEqキット 療法名:GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1L 8m l 20m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	アロシ点滴静注パック(0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカロン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序②	750 μ g 6.6m g		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食(500ml) 療法名:GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射:	0m g 100m l		ホダ時						

[illegible]

最大クール数：0クール

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【放射線併用【なし】レジメン名称 : GC (GEM+CDDP) 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	生食 (1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) KCL注 20mEq キット 療法名:GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1L 8m l 20m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	アキシ点滴静注パッケ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカトロン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序②	750 μ g 6.6m g		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシロン点滴静注液 (200mg, 1g) 「ヤクルト」 ブドウ糖 5% (100ml) 療法名:GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 100m l		ホダ時						
05	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:GC (GEM+CDDP) 療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホダ時						